



2 TÉTINES LARGE OUVERTURE POUR BIBERON EN SILICONE

NOTICE D'INSTRUCTIONS

Les valves anti-coliques de nos tétines L.O en silicone évitent à bébé d'avaler de l'air pendant la tétée, cause des coliques du nourrisson. Une tétée de 15 à 20 minutes permettra à l'estomac de l'enfant d'assimiler le volume du lait. La digestion des corps gras du lait sera facilitée si le lait est chauffé dans un chauffe biberon. Bonne digestion = bon sommeil.

IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE :

• Toujours se laver les mains avant de préparer et donner le biberon à votre bébé. • Avant la première utilisation, démonter le biberon, la tétine, les accessoires et nettoyer à l'eau chaude savonneuse puis rincer abondamment. Ensuite, les stériliser 5 minutes par ébullition ou dans un stérilisateur électrique afin d'éviter les problèmes intestinaux. • Avant et après chaque usage, nettoyer avec soin par mesure d'hygiène. Utiliser un goupillon pour bien nettoyer le biberon. • Il est déconseillé de mettre la tétine au lave-vaisselle; cela pourrait la fragiliser. • Ne jamais utiliser de produits abrasifs, solvants ou chimiques. • Lorsqu'il y a un système de valve d'aération dans la tétine, aucun goupillon ou autre produit de nettoyage similaire ne doit être inséré dans les valves car cela pourrait endommager le fonctionnement de celles-ci. Nettoyer uniquement à la main avec de l'eau savonneuse.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant. AVERTISSEMENT !

• La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.
• Toujours vérifier la température de l'aliment avant de donner le biberon.
• Jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité.
• Garder tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants.
• Ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets ou des éléments vestimentaires lâches. Votre enfant pourrait s'étrangler.
• Ne jamais utiliser une tétine de biberon en guise de sucette.
• Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
• Des accidents se sont produits lorsque des bébés ont été laissés sans surveillance avec un article pour l'alimentation liquide à cause de la chute du bébé ou si l'article a été désassemblé. • Ne jamais laisser l'enfant se déplacer ou courir avec un biberon dans les mains ou dans la bouche. • Des caries dentaires peuvent survenir chez le jeune enfant même s'il consomme des liquides non sucrés. Elles peuvent apparaître si le bébé utilise le biberon pendant des périodes prolongées le jour et surtout la nuit, lorsque le flux de salive se réduit ou si le biberon est utilisé en guise de sucette. • Avant chaque utilisation, inspecter et tirer sur la tétine dans tous les sens; ne plus l'utiliser si elle est endommagée. • Si vous chauffez le biberon au micro-ondes, retirer le système (tétine, bague et capuchon) afin d'éviter les risques d'explosion.
• Redoubler de prudence en cas de chauffage au micro-ondes, il peut engendrer localement des températures trop élevées. • Toujours mélanger l'aliment une fois chauffé et vérifier la température avant de servir. • Ne pas exposer le biberon et la tétine directement au soleil ou à la chaleur. Ne pas laisser la tétine dans une solution de stérilisation au-delà de la durée recommandée, cela pourrait la fragiliser.
• Ne pas essayer d'agrandir le trou de la tétine, car cela entraînerait une déchirure. Toutes les tétines s'usent, surtout lorsque l'enfant a des dents. • Remplacer la tétine après 1 ou 2 mois d'utilisation par mesure d'hygiène.

Conforme à la norme EN14350.



S.E.B.I.R
54 rue Rouget de Liste
F.93697 PANTIN CEDEX
www.dBb-remond.fr



Tous les papiers se trient et se recyclent



2 WIDE NECK TEATS FOR SILICONE BABY BOTTLE

INSTRUCTIONS MANUAL

The anti-colic valves on our teat avoids baby to swallow air, cause of baby's colics. A 15-20 minutes feeding, allows baby's stomach to assimilate the milk. The digestion of milk's fats will be easier if the milk is heated by a bottle warmer. Good digestion = good sleep.

IMPORTANT ! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE:

• Always wash your hands before preparing feeds and feeding your baby. • Before first use, disassemble and clean the feeding bottle, teat and accessories with warm soapy water and rinse. Then sterilize by boiling 5 minutes or in steam water sterilizer to avoid intestinal problems. • Before and after each use, clean carefully to ensure hygiene. Use a bottle brush to thoroughly clean the bottle. • It's not recommended to wash the teat in dishwasher, this could damage it. • Do not clean or allow to come into contact with solvents or harsh chemicals. • Where there is some venting valve system in teat, no brush or similar cleaning aid should be inserted in valves as that may damage the valve function. It should only be cleaned by rubbing with hands in soapy water.

For your child's safety and health. WARNING!

• Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
• Always check food temperature before feeding.
• Throw away at the first signs of damage or weakness.
• Keep all components not in use out of the reach of children.
• Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child could be strangled.
• Never use feeding teats as a soother.
• This product must always be used under adult supervision.
• Accidents have occurred when babies have been left alone with drinking equipment due to the baby falling or if the product has disassembled. • Never let the child move or run with a baby bottle in his hands or mouth.
• Tooth decay in young children can occur even when non-sweetened fluids are used. This can occur if the baby is allowed to use the bottle for long periods through the day and particularly through the night, when saliva flow is reduced or if it is used as a soother. • Inspect the feeding teat before each use and pull it in all directions; throw away if it is damaged. • If you heat the feeding bottle in micro-waves, remove the system and teat. • Take extra care when microwave heating; localized overheating can occur. • Always stir the heated food and check the temperature before serving. • Do not leave a feeding teat in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant ("sterilizing solution") for longer than recommended, as this may weaken it.
• Do not attempt to enlarge teat's hole, as this will cause tearing. All teats wear out, especially when child has teeth. • Change the teat after 1 or 2 months of use to ensure hygiene.

Complies with the standard EN14350.

4+ MOIS / MONTHS


Placer sous le nez du bébé le percage en croix en fonction du débit choisi. Tourner 1/4 de tour pour changer le débit.
Place the cross cut under the baby's nose according to the flow rate chosen. Quarter turn to change the flow rate.



FAIBLE / SMALL



MOYEN / MEDIUM



PERÇAGE EN CROIX
CROSS CUT

2 x VALVES
ANTI-COLIQUES
2 x ANTI-COLIC
VALVES